

Doporučené dávkování

Vaše léčba probíhá ve dvou fázích:

• Úvodní léčba:

Tato fáze spočívá v postupném zvyšování podávané dávky. Léčba je zahájena s lahvičkou o koncentraci 10 IR* (modré víčko) a po šesti dnech pokračuje s lahvičkou o koncentraci 300 IR* (fialové víčko).

Modrá 1x			Fialová 2x		
Dávkovací schéma					
10 IR/ml			300 IR/ml		
Den	Počet dávek	Datum	Den	Počet dávek	Datum
1	1/.....	6	1/.....
2	2/.....	7	2/.....
3	3/.....	8	3/.....
4	4/.....	9	4/.....
5	5/.....			

*IR = index reaktivity (vyjadřuje sílu alergenů v přípravku)

• Udržovací léčba:

Lahvička s koncentrací 300 IR/ml
(fialové víčko)

Po ukončení iniciační fáze je užívána udržovací dávka.

• denně: 2 až 4 dávky roztoku s koncentrací 300 IR/ml

nebo

- 4 dávky 3x týdně roztoku s koncentrací 300 IR/ml

OBECNĚ PACIENTŮM DENNÍ UŽÍVÁNÍ
VYHOVUJE VÍCE NEŽ UŽÍVÁNÍ 3X TÝDNĚ,
PROTO JE DOPORUČENO

Lékařem předepsané dávkování udržovací léčby:

počet dávek roztoku: denně

Roztok se nechá působit pod jazykem po dobu 2 minut před tím, než se spolkne (sublingvální způsob užití).

Při otevření poslední lahvičky si domluvte návštěvu u svého lékaře-alergologa.