

**ORALAIR, Alergenová imunoterapie - podjazyková pylová vakcína.**

1.den: 1 tbl. a 100 hned ráno pod jazyk, ponechat 1-2 min. rozpustit, pak zapít čistou vodou

2.den: 2 tbl. a 100 hned ráno pod jazyk, ponechat 1-2 min. rozpustit, pak zapít čistou vodou

od 3.dne aplikace: 1 tbl. a 300 hned ráno pod jazyk, ponechat 1-2 min. rozpustit, pak zapít čistou vodou

Podává se pak denně celkem 6 měsíců (6 balení po 30 tbl.), nejméně 3 roky po sobě, zpravidla od prosince.

Vynechává se jen při nemoci (horečnatá viróza, atb, dušnost.....)

Vynechá se těsně po očkování

Vynechá se, pokud je nějaká reakce po aplikaci

V případě alergické reakce po vakcině se podá antihistaminkum, další dávku je lepší konzultovat.

Pokud bude vakcína tolerována týden, volejte si o další dávku, aby se nemusela léčba přerušovat, pak již dostanete recept na 3 měsíce.

MUDr. Jan Radina

Tel. 723 582 622

[alergologie-pediatric@seznam.cz](mailto:alergologie-pediatric@seznam.cz)